**Лекарственные средства,
применяемые при хронической
ишемической болезни сердца (ИБС)**

ИБС— заболевание, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям

Нарушение кровотока по коронарным артериям в результате органических или функциональных поражений.

Наиболее частые поражения:

Органическое – стенозирующий атеросклероз

Функциональное – спазм, тромбоз.

Модифицируемые факторы риска ИБС

- Гиперхолестеринемия
- Артериальная гипертензия
- Сахарный диабет
- Курение
- Гиподинамия
- Ожирение

Препараты, улучшающие прогноз ИБС

Антиагреганты

Снижают риск формирования тромбов в коронарных артериях. Пример: ацетилсалициловая к-та (75-150 мг/сут) необратимо ингибирует ЦОГ, снижает синтез ТхА₂.

Гиполипидемические средства (статины)

У больных ИБС необходимо достижение целевых значений ХС-ЛПНП < 1,5 ммоль/л или > чем на 50% от исходного уровня (аторвастатин, розувастатин).

Препараты, снижающие активность РААС

ИАПФ снижают общую смертность, риск развития ИМ, инсульта у пациентов с ХСН и осложненным СД. Назначение больным хИБС при сопутствующих АГ, ХСН (фракция выброса < 40%), СД.

Патогенез ИБС

Потребность миокарда в O_2 $\gg$ доставка O_2 к миокарду

Потребность определяют:

- ✓ напряжение стенок левого желудочка (пост- и преднагрузка)
- ✓ работа сердца (ЧСС, сократимость)

Доставку определяет:

- ✓ величина коронарного кровотока (сопротивление «коронаров», перфузионное давление, ЧСС)

Препараты антиишемического действия, улучшающие симптоматику (антиангинальные средства)

- **Нитраты / нитратоподобные (молсидомин)**
- **β -адреноблокаторы**
- **Блокаторы медленных кальциевых каналов**
- Ивабрадин – ингибитор I_f -каналов СА-узла, снижает ЧСС, не влияет на сократимость и проводимость. При противопоказаниях к β -блокаторам больным стабильной стенокардией с синусовым ритмом 0,005 × 2 р/сут.
- Никорандил – активатор АТФ-зависимых К-каналов. Расширяет коронарные сосуды. Для купирования приступов – 20 мг под язык, для профилактики – 0,010 - 0,02 × 3 р/сут.
- Ранолазин – ингибитор «поздних» Na -токов миокарда. Уменьшает перегрузку миокарда Ca . Снижает сократимость и напряжение стенок миокарда, снижает потребность в O_2 . Показан при неэффективности основных средств, 0,5 -1,0 × 2 р/сут.

Препараты метаболического действия, улучшающие симптоматику при ХИБС

Триметазидин

Ингибитор β -окисления жирных кислот.

Уменьшает гипоксию миокарда.

Не оказывает влияния на гемодинамику.

Противопоказан при двигательных нарушениях.

Комбинируют с антиангинальными средствами: внутрь
20-35 мг $\times$ 2-3 р/сут.

Основные группы антиангинальных средств

Нитраты

Бета-
адреноблокаторы

Блокаторы
медленных
Са-каналов

- ✓ Нитроглицерин
- ✓ Изосорбида динитрат
- ✓ Изосорбида мононитрат

- ✓ Бисопролол
- ✓ Метопролол
- ✓ Атенолол
- ✓ Небиволол

- ✓ Верапамил
- ✓ Дилтиазем
- ✓ Амлодипин
- ✓ Нифедипин

Нитраты: механизм действия

Нитроглицерин

Нитраты: механизмы антиангинального действия

Дополнительные эффекты нитратов

- **Расслабление гладкой мускулатуры**
(бронхов, ЖКТ, мочеполовой системы,
сосудов)
- **Антиагрегантное действие**

Побочные эффекты нитратов

- ✓ Тахикардия
- ✓ Артериальная гипотензия (ортостатическая)
- ✓ Покраснение кожи лица, шеи, ощущение жара
- ✓ Головная боль, головокружение
- ✓ Толерантность

Механизмы толерантности к нитратам

Уменьшение превращения нитратов в NO

Ускоренная инактивация NO

Рефлекторная активация PAC

Ослабление активации гуанилатциклазы и уменьшение образования цГМФ

Повышенное образование ангиотензина II

Снижение содержания Ca^{2+} в гладкомышечных клетках

Ослабление вазодилатации

Усиление вазоконстрикции

Толерантность к нитратам

Препараты нитроглицерина

Путь введения	Форма выпуска	Применение
Сублингвальный	Таблетки (0,5 мг) Дозированный аэрозоль (0,2 мг)	Купирование приступа
Буккальный	Пленки (1 – 2 мг) начало – 2 мин. длительность – 3-4 ч.	Профилактика приступа стенокардии
Трансдермальный	Мазь (2%), пластырь, диск (10-20-50 мг) начало – 30 мин. длительность – 3-6 ч (мазь), 18-24-32 ч (пластырь, диск)	
Внутривенный	Раствор для в/в введения (0,1%)	ОКС; ОИМ; Острая левожел. нед-ть

Сравнительная биодоступность нитратов

Путь введения	Нитроглицерин	Изосорбида динитрат	Изосорбида моонитрат
Сублингвально	30 – 80 %	30 – 60%	-
Внутрь	0 – 10%	20 – 25% (не пролонгированные) + образование активных метаболитов	100%

β-адреноблокаторы: механизмы антиангинального действия

блокируют β-адренорецепторы и устраняют адренергические влияния на сердце и почки

- ↓ ЧСС
- ↓ силы сокращений сердца
- ↓ секреции ренина → ↓ АТII (↓ ОПСС и постнагрузки)

Уменьшение потребности
миокарда в кислороде

β-адреноблокаторы: побочные эффекты

- ✓ Головная боль, сонливость
- ✓ Брадикардия, нарушение АВ-проводимости
- ✓ Сердечная недостаточность
- ✓ Артериальная гипотензия
- ✓ Сужение периферических сосудов
- ✓ Бронхоспазм
- ✓ Повышение тонуса матки
- ✓ Гипогликемия
- ✓ Нарушение липидного обмена
- ✓ Синдром отмены

β-адреноблокаторы:

противопоказания

- ✓ Вазоспастическая стенокардия
- ✓ АВ-блокада II и III степени
- ✓ Острая сердечная недостаточность
- ✓ Бронхиальная астма

Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК)

БМКК блокируют потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа, что ведет к угнетению трансмембранного тока Ca^{2+} в:

- ✓ Кардиомиоцитах
- ✓ Гладкомышечных клетках сосудов

БМКК: механизмы антиангинального действия

Уменьшение потребности миокарда в кислороде

- ✓ ↓ ЧСС (верапамил, дилтиазем)
- ✓ ↓ Постнагрузки

Увеличение доставки кислорода к миокарду

- ✓ Расширение коронарных сосудов
- ✓ Увеличение субэндокардиального кровотока
- ✓ Увеличение коллатерального кровотока

Другие эффекты БМКК

- ✓ Антигипертензивный
- ✓ Противоаритмический (верапамил, дилтиазем)
- ✓ Антиагрегантный

Классификация БМКК

Группы препаратов	Особенности действия	Препараты		
		I поколения	II поколения	III поколения
Дигидропиридины	Влияние на сосуды >, чем влияние на сердце	Нифедипин	Нифедипин (ретард) Фелодипин	Амлодипин
Бензотиазепины	Влияние на сосуды = влиянию на сердце	Дилтиазем	Дилтиазем (ретард)	
Фенилалкиламины	Влияние на сердце >, чем влияние на сосуды	Верапамил	Верапамил (ретард)	

Особенности действия БМКК на сердечно-сосудистую систему

Параметры	Нифедипин	Дилтиазем	Верапамил
ЧСС	↑	↓	↓↓↓
АВ-проводимость	-	↓	↓↓
Сократимость миокарда	-/↓	↓	↓↓
Коронарный кровоток	↑↑↑	↑↑	↑
Тонус периферических сосудов	↓↓↓	↓	↓

Особенности препаратов II поколения

- ✓ Более длительное действие, чем препаратов I поколения (назначают 1-2 раза в сутки)
- ✓ Не вызывают значительного колебания сосудорасширяющего и гипотензивного действия
- ✓ Менее выражены побочные эффекты: повышение ЧСС и ударного объёма сердца (у препаратов дигидропиридиновой структуры)

Особенности препаратов III поколения

- ✓ Высокая биодоступность
- ✓ Незначительные различия между минимальной и максимальной концентрациями в плазме крови
- ✓ Сверхдлительное действие (назначают 1 раз в сутки)

Показания к применению БМКК

- ✓ Стабильная стенокардия напряжения
- ✓ Вазоспастическая стенокардия
- ✓ Артериальная гипертензия
- ✓ Тахиаритмии (верапамил, дилтиазем)

БМКК: побочные эффекты

Со стороны сердечно - сосудистой системы:

- ✓ Брадикардия, АВ-блокада (верапамил, дилтиазем)
- ✓ Сердечная недостаточность (верапамил, дилтиазем)
- ✓ Тахикардия (амлодипин, нифедипин)
- ✓ Гиперемия кожных покровов
- ✓ Артериальная гипотензия
- ✓ Отеки голеней и стоп
- ✓ Синдром «обкрадывания» (при нестабильной стенокардии)

Со стороны ЖКТ:

- ✓ Диспепсия, обстипация

Со стороны нервной системы:

- ✓ Головная боль, головокружение
- ✓ Усталость, сонливость, слабость

Аллергические реакции:

- ✓ Кожная сыпь, зуд

Спасибо за внимание!